

Espécies Interessantes

Roberto Agnes*



Cycnoches loddigesii

Cultivo: Dr. G. Staal

Qualquer um que tenha visto uma planta de *Cycnoches* em flor dificilmente não ficou embevecido pela forma interessante de suas flores. Comumente chamada de orquídea cisne, o nome *Cycnoches* vem do grego *kyknos* (cisne) e *anchen* (pescoço) que alude à formação do labelo branco e esbelta coluna arcada.

O gênero é endêmico nos trópicos americanos e foi primeiro descrito, em 1832, por John Lindley. Existem aproximadamente doze espécies nesse gênero, que é dividido em duas seções. Na primeira, *Eu-cycnoches*, a flor macho e a flor fêmea têm formas similares, incluindo espécies como *Cyc.cholorochilum*, *Cyc.lehmanni* e *Cyc.loddigesii*. Na seção *Heteranthae*, que compreende, entre outras, *Cyc.egertonianum* e *Cyc.pentadactylum*,

a estrutura do labelo, na flor masculina, é bem distinta da flor feminina.

As plantas de *Cycnoches* são bem parecidas com as de *Catasetum* e podem ser cultivadas juntas, já que como os *Catasetum* elas não gostam de frio, não devendo a temperatura adequada ser inferior a 12°C, durante o inverno. No verão elas suportam temperaturas bem altas desde que o ar seja mantido úmido. As plantas devem ser cultivadas num composto bem aberto, por exemplo, xaxim bem desfibrado, e os vasos suspensos no teto do orquidário. As plantas são decíduas e, depois de florescer, quando perderem as folhas, pouca água deve ser dada, devendo as plantas ficar numa área mais seca do orquidário. Quando o novo broto começar a despontar a rega pode ser recomeçada e uma vez que as novas folhas apareçam deve-se regar e fertilizar com frequência e regularidade já que essas plantas

* Travessa Pepe, 98/201 — Botafogo — CEP 22.290 — Rio de Janeiro.

são vorazes. As plantas gostam de luz forte e podem ser suspensas sobre as *Cattleyas*, sempre certificando de que existe umidade suficiente e boa circulação de ar.

Cycnoches loddigesii é endêmica do Brasil, Colômbia e Venezuela e foi denominada em honra de Messrs. Loddiges da Inglaterra. As plantas desta espécie são bem grandes e os pseudobulbos, que medem até 20cm de altura, produzem de 5 a 7 folhas de até 40cm de comprimento. A inflorescência é produzida perto do ápice do pseudobulbo e produz de 6 a 10 flores, que medem até 9.5cm de diâmetro. As pétalas e sépalas são de um verde-oliva pálido e o labelo branco é pintado com manchas cor de chocolate. A coluna é esbelta, arcada e mede até 7cm de altura.

Com flores tão impressionantes, é natural que *Cycnoches* tenha sido usada em hibridação, e um número de híbridos intergenéricos com *Catasetum* e *Mormodes* têm sido registrados. Tem-se notado que as flores femininas são duradouras e há a esperança de que a progênie herde essa qualidade.

Infelizmente, híbridos entre *Cycnoches* e *Catasetum* não têm produzido flores de longa duração. A *Catanoches* Penthouse (*Cyc.haagii* x *Cts.pileatum*), por exemplo, produz lindas flores que só duram uma semana.

Resultados melhores têm sido alcançado com a *Cycnodes* (*Cycnoches* x *Mormodes*), sendo que um dos híbridos mais impressionantes por sua beleza é o *Cycnodes* Wine Delight (*Cyc.lehmanni* x *Morm.sinuata*) que produz flores de uma grande gama de cores. O melhor clone, *Cynd.* Wine Delight 'Jem' FCC/AOS tem flores de cor vinho tinto e foi a única planta do grupo *Catasetum* a receber um FCC/AOS até hoje.

Muito trabalho tem sido feito com estas estranhas e belas plantas nos EUA, quase sempre com bons resultados, tornando-as ainda mais populares.

O Brasil é rico em espécies de *Catasetum*, *Mormodes* e *Cycnoches* e esperamos em breve ver mais dessas espécies e seus híbridos em coleções pelo país.



FLORÁLIA[®]

ORQUIDÁRIOS REUNIDOS LTDA

CAIXA POSTAL N.º 100.541
24.000 - NITERÓI - RJ

ESPÉCIES, HÍBRIDOS E MERISTEMAS

ENVIAMOS LISTA MEDIANTE SOLICITAÇÃO

ABERTA TODOS OS DIAS DE 8:00 ÀS 17:00

EST. DA FIGUEIRA, 592
TEL.: (021) 719-5800
NITERÓI 24.000 - RJ

RUA MAESTRO OCTÁVIO MAUL, S/N.º
TELS.: (0242) 42-4340 e 43-6050
PETRÓPOLIS - RJ