

Uma Nova Espécie de *Oncidium* do Estado da Bahia

Vitorino Paiva Castro Neto *
Marcos Antonio Campacci *

Resumo

Este trabalho faz um rápido comentário sobre o gênero *Oncidium*, descreve o local onde esta nova espécie é encontrada, seguida pela descrição da nova espécie (*Oncidium silvanum* n. sp.)

Abstract

This work makes a short comment on the genus *Oncidium* and explains where this new species is found, followed by a description of the new species (*Oncidium silvanum* n. sp.)

O gênero *Oncidium* foi estabelecido em 1800 por Olaf Swartz um botânico sueco e o nome foi escolhido da palavra grega "ONKOS" que quer dizer tumor em referência aos calos do labelo, comuns neste gênero. Esta nova espécie é proveniente das zonas montanhosas da região de UNA, no sul da Bahia. Estas montanhas com altitude entre 300-500m próximas do mar determinam a formação de uma região bastante úmida, onde cresce uma flora endêmica com muitas espécies específicas. A região de UNA se caracteriza por ser uma região muito particular, pois possuindo um clima quente e úmido se assemelha ao da região amazônica. São provenientes desta

região algumas espécies como *Stenia pallida*, *Koellenstenia graminea*, *Aganisia pulchella* e *Mendoncella ciliata* que são espécies típicas da região amazônica. É interessante ressaltar que estas crescem junto com algumas *Cattleyas* como, *C. kerrii*, *C. schofieldiana* e *C. schilleriana*.

Queremos homenagear neste trabalho o Sr. Edmundo Ferreira da Silva, orquidófilo e pesquisador, que tanto tem contribuído para o conhecimento da flora da Bahia.

The genus *Oncidium* was described in 1800 by the Swedish botanist, Olof Swartz. The name is derived from *onkos* referring to the callus on the lip, a common feature in this genus. This new species is endemic to the mountains of the UNA region in the southern parts of Bahia and grows at an elevation of 300-500m. The UNA region is situated close to the sea and is characterised by climatic conditions that approximate those of the Amazon region. As a result the region is quite humid and the endemic flora contains a number of species that are also native to the Amazon, for ex. *Stenia pallida*, *Koellenstenia graminea*, *Aganisia pulchella* and *Mendoncella ciliata*. These species grow along with *Cattleya* species such as *C. kerrii*, *C. schofieldiana* and *C. schilleriana*. *Oncidium silvanum* was named in honour of Mr. Edmundo Ferreira da Silva, researcher and orchidist, whose contributions have been invaluable to furthering our knowledge of the flora of the state of Bahia.

* Círculo Paulista de Orquidófilos.
— Rua Álvares Machado, 41 — 20º ANDAR —
Conj. B-C-D; — São Paulo — SP.

Descrição da espécie

Oncidium silvanum P. Castro & Campacci n. sp.


Epiphyticum, *Racidibus*, filiformibus, flexuosis, glabris, rhizoma, valde abbreviatum, ;*Pseudobulbi*, teretiusculi, 4,5-7,0cm longi, 1,0-2,0cm lati, unifoliati. *Folia*, elliptico-acuminata, 10,0-15,0cm longa, 2,0-3,0cm lata. *Sepalae dorsualis*, obovato-complanata, conchata, 10mm longa, 10mm lata, flava et brunneo coccinea; *Sepalae lateralis*, in synsepalum ellipticum, leviter conchata, 6mm longum, 5mm latum, flavum brunneo-coccineum striatum; *Petalae*, sub-claviformis, leviter curvatae, 13mm longae, 9mm latae, coloris similiter sepalae dorsuales. *Labelum*, trilobatum, 12mm longum, 9mm latum. cum unguiculus 3mm longi, *lobi laterali* trapezoidi, 2,5mm longi, 2.5mm lati, flavi et brunneo coccinei, *lobus centralis* subreniformis, bilobulatus curvatus, 5mm longus, 9mm latus, brunneo coccineus. *Calus*, in undulatae lamnulae formis, synmetricae, post nudus locus et post undulatum tuberculum qualis prominentum in centralis lobus.



Oncidium silvanum
Cultivo: V. Paiva Castro — Foto: Marcos Campacci

Epifita, caespitoso, c.a. 15,0-20,0cm de comprimento, *Raízes*, glabras, flexuosas, alvacentas, c.a.1,0-1,5mm de espessura. *Rizoma*, bastante curto. *Pseudobulbos*, teretiformis, c.a. 4,5-7,0cm de comprimento por c.a.1,0-2,0cm de largura, normalmente com 1 folha apical às vezes duas. *Folhas* sub-coriáceas, lisas, brilhantes, elíptico aguçadas, c.a. 10,0-15,0cm de comprimento por c.a.2,0-3,0cm de largura, ápice agudo. *Inflorescência*, base dos pseudobulbos, nutante, paniculada, c.a.15,0-20,0cm de comprimento. *Escapo*, arqueado, de c.a.1,0-1,5mm de espessura, com bainhas amplexas triangulares de c.a.6,0mm de comprimento, espaçadas c.a.3-4cm. *Racimo*, cerca de 1/3 da inflorescência com 6 a 20 flores, brácteas inconspícuas. *Flores*, densamente agrupadas, c.a. 17,0mm de diâmetro; *Sépala dorsal*, oboval-achatada, aconchavada, arqueada sobre a coluna, c.a.10,0mm de comprimento, por c.a.10,0mm de largura, de cor amarelo ouro e escarlate acastanhada da metade para o ápice. *Sépalas laterais*, conchadas em sinsépalo, elíptico, levemente aconchavado, c.a.6.0mm de comprimento, por 5,0mm de largura, amarelo ouro com listras escarlates acastanhadas, *Pétalas*, subclaviformes, ligeiramente recurvadas sobre a coluna, c.a.13,0mm de comprimento por c.a.9,0mm de largura, de coloração similar a sépala dorsal. *Labelo*, nitidamente trilobado de c.a. 12,0mm de comprimento por c.a. 9,0mm de largura, com unguículo de c.a. 3,0mm de comprimento por c.a. 1,5mm de largura na base e c.a. 3,0mm de largura na interseção com os lobos laterais; *lobos laterais* de forma trapezoidal de c.a. 2,5mm por c.a. 2,5mm, estes divididos transversalmente na sua metade em amarelo ouro na parte posterior e escarlate acastanhado na parte frontal; *Lobo mediano*, sobreniforme bilobulado recurvado para sua parte posterior, c.a. 5,0mm de comprimento por c.a. 9,0mm de largura, escarlate acastanhado, *Calos*, sobre disco central em forma de placas onduladas, simétricas com reentrância na parte anterior, com pequena separação e a seguir uma calosidade em forma de mas-

Oncidium silvanum P. Castro & Campacci



sa ondulada que avança sobre o lobo mediano, caracterizando-se pelo aspecto brilhante que apresenta. *Coluna*, alada, de c.a. 6,0mm de comprimento por c.a. 6,0mm de largura de envergadura nas asas e c.a. 1,8mm de diâmetro na base, *Estigma*, pubescente, *Antera*, em forma de capuz, bilobada, com base terminando em dois apêndices recurvados, *Polineas-2*, c.a. 1,8mm de comprimento total, amareladas com longo caudículo.

HABITAT: Brasil: Bahia: Município de Arataca, c.a. 300-500.m.s.m., leg. Edmundo Ferreira da Silva, s/n., fl. cult. 10/10/1990

HOLOTYPUS (HERBARIUM SP)

O colorido e a forma do labelo deste novo *Oncidium* da seção *Walueva*, chama a atenção pelo fato de ser bem diferente das outras espécies desta seção, por isto nenhum comentário adicional é necessário, pelo fato de não se ter nenhuma espécie em particular com a qual possa ser comparada.

The colour and shape of the flower of this new *Oncidium* from the *Walueva* section are quite different from the other species in the section. Due to this and the fact that there exists no similar species, no additional remarks were deemed necessary.