



Bletia Catenulata Alba

Lou Menezes

O gênero **Bletia** foi, primeiramente, descrito em 1794 por Ruiz et Pavón (**FL. Peruv. & Chili. Prodr.**, 119, 1794) e batizado em homenagem ao espanhol Luiz Blet, administrador do Jardim Botânico de Algeciras, em Cádiz, Espanha. As espécies deste gênero são caracterizadas pela presença de um colmo basal com folhas apicais estreitas. A inflorescência emerge da base da folha ou ao lado do colmo. No Brasil, o gênero é representado pela **Bletia catenulata** Ruiz et Pavón, também conhecida pelos sinônimos **Bletia rodriguesii** Cogn., **Bletia sanguinea** Poepp et Endl., e **Bletia sherrattiana** Batem. A espécie é típica de solo hidromórfico dos campos do Planalto Central brasileiro numa altitude de 800-

1400 m., aonde a vegetação dominante é de gramíneas e sempre sujeita aos incêndios anuais do período seco e frio de maio a setembro, inverno/primavera brasileira. Sua floração ocorre no início de outubro, imediatamente após a fase crítica dos incêndios da região e coincidindo com a chegada das primeiras chuvas.

The genus **Bletia** was described in 1794 by Ruiz et Pavón (**FL. Peruv. & Chili. Prodr.**, 119, 1794) and named in honor of the Spaniard Luiz Blet, who maintained the Algeciras Botanical Garden in Cádiz, Spain. In Brazil, the genus is represented by **Bletia catenulata** Ruiz & Pavón, also known by the synonyms **Bletia rodriguesii** Cogn., **Bletia sanguinea** Poepp et Endl., and **Bletia sherrattiana** Batem. This genus is characterized by the presence of a basal corm with apical



Rubinho com haste floral de *Bletia catenulata*



NOVA VARIEDADE / NEW
VARIETY

Bletia catenulata* var. *alba
L.C.Menezes **var. nov.**

Flores hujus varietatis
differunt a floribus typicis speciei
colore tantum. Flores albis puris.
Holotypus-UB92.

thin leaves. The inflorescence emerges from the base of the leaf or from the side of the corm. The species is a typical plant of the hydromorphic soil in the fields of the Brazilian Central Plateau at about 800-1400 meters., above sea level, where the dominant vegetation is graminious and is always subject to annual bush fires during the cool, dry period from May to September, the Brazilian winter/spring. It flowers primarily in October, immediately after the critical phase of the bush fires in the region and coinciding with the first rains.



**Não coletar orquídeas é um hábito
saudável. Visitar os habitats para
conhecer as condições em que vegetam
certas orquídeas é muito bom. Faça
anotações e fotografe. Escreva sobre isso**