




C. loddigesii var. *rubra*
"Sonho Meu"

Cattleya
loddigesii

X

Cattleya
harrisoniana

Por João Paulo



C. harrisoniana var. *suave* "Marajá"

Ao coletarmos dados históricos sobre a *Cattleya loddigesii*, encontramos informações contraditórias e confusas, relacionando-a com a *Cattleya harrisoniana*.

A *Cattleya loddigesii* foi a primeira *Cattleya* conhecida em cultivo.

Em 1810, Mr. E. J. S. Woodford enviou de São Paulo, Brasil, para Mr. Shepherd, que era diretor do Liverpool Botanic Garden, Inglaterra, várias mudas de uma orquídea que floresceram em 1811. Mr. Loddiges conseguiu uma muda dessa espécie e, em 1819, classificou-a como *Epidendrum violaceum*, descrevendo-a no *Botanical Cabinet* t.337.

Em 1823, John Lindley a enquadrou como pertencendo ao gênero *Cattleya*, nominando-a de *Cattleya loddigesii*, homenageando o seu proprietário, Conrad Loddiges.

Em 1836, Mr. Harrison, que residia no Rio de Janeiro, enviou para seus irmãos, em Liverpool, Inglaterra, algumas mudas de uma


orquídea, classificada por James Bateman como *Cattleya intermedia* var. *harrisoniana*.

Em 1838, James Bateman, que era botânico do Instituto de Kew, na Inglaterra, reconsiderou a sua classificação, elevando-a à categoria de espécie distinta, nominando-a como *Cattleya harrisoniae*.

Durante muito tempo, a *Cattleya loddigesii* e a *Cattleya harrisoniana*, pela semelhança de suas flores, foram confundidas. Essa dúvida perdurou até bem pouco tempo.

F. C. Hoehne na sua *Iconografia de Orchidaceas do Brasil*, editada em 1949, pela Secretaria de Agricultura de São Paulo, na folha 242, considera a *Cattleya harrisoniana* como uma subespécie da *Cattleya loddigesii*, levando em conta as suas diferenças florais, como resultantes das condições climáticas dos seus habitats.

Augusto Ruschi, em seu livro *Orquídeas do Estado do Espírito Santo*, editado em 1986,



C. loddigesii var. *venosa* "Sangue Real"



C. loddigesii var. *venosa* "Romeu"



C. loddigesii var. *punctata* "Flor do Campo"



C. loddigesii
var. *punctata*
"Sheherazade"

registra algumas fotos, identificando-as como *Cattleya harrisoniana*.

Observando-se bem as duas espécies, vemos que suas características, apesar de semelhantes, são bem diferentes, inclusive as regiões onde são encontradas.

A *Cattleya loddigesii* é encontrada em regiões serranas, em altitudes que variam de 600/1000 m.s.m., em áreas alagadiças e em beira de rios. É localizada com maior predominância nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, podendo ocorrer em menor incidência em áreas fronteiriças do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A *Cattleya harrisoniana*, ao contrário, é achada em regiões litorâneas, em terrenos baixos, mas alagadiços e com bastante luminosidade. Sua maior ocorrência é nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Outro fator que reforça essa distinção é que a *Cattleya loddigesii* tem o auge de sua floração no inverno, entre os meses de junho e agosto, indo às vezes até setembro. Dependendo da intensidade do frio pode florir esporadicamente entre dezembro e janeiro.

A *Cattleya harrisoniana* apresenta sua maior floração durante o verão, começando em fins de dezembro e indo até meados de fevereiro, não florescendo durante o inverno. O seu cultivo é bem mais difícil em regiões de clima frio e de alta altitude.

Um outro detalhe que ajuda a diferenciar uma da outra é que na *Cattleya loddigesii* as nervuras do labelo sob a coluna são muito menos pronunciadas do que na *Cattleya harrisoniana*, que as apresenta carnudas e rugosas. Os lóbulos laterais do labelo, que na *Cattleya loddigesii* são maiores e mais lisos, na *Cattleya harrisoniana* são mais crespos e mais rugosos.

As flores de ambas são pequenas, apresentando em suas hastes florais grande quantidade de flores, ressalvando-se que as da *Cattleya loddigesii* são normalmente maiores do que as da *Cattleya harrisoniana*.

Pertencem às *Cattleyas* bifoliadas. O perfume da *Cattleya loddigesii* lembra o do *Heliotrópio* misturado com rosas.

Vimos que, em 1887, Veitch considerou a *Cattleya harrisoniana* como uma var. da *Cattleya loddigesii*. Não devemos culpá-lo por isso, pois naquela época não deveria haver muitos exemplares dessas orquídeas em cultivo na Europa, sendo, portanto, muito difíceis suas análises e comparações.

▼ *Cattleya loddigesii*

John Lindley - 1823

Registro feito em *Collectanea Botanica* t.33-t.37

Sinônimos:

- ▼ **1819** - *Epidendrum violaceum* - registro feito por Loddiges no *Botanical Cabinet* t.337
- ▼ **1825** - *Epidendrum canaliculatum* - registro feito por Vellozo em *Florae Fluminensis* sub. (1790) - *Icones* 9 t.10
- ▼ **1838** - *Cattleya ovata* - registro feito por John Lindley no *Botanical Register* sub. (1919) (vide *C. intermedia*)
- ▼ **1843** - *Cattleya arembergii* - registro feito por Scheidweiler no *Allgemeine Gartenzeit* 11:109
- ▼ **1861** - *Epidendrum loddigesii* - registro feito por Reichenbach f. em *Walper's Annales Botanices Systematicae* 6:316



C. loddigesii var. *lilás* "Valsa do Adeus"



C. loddigesii var. *caerulea* "Blue Moon"



C. loddigesii var. *lilás* "Porta Bandeira"



C. loddigesii
var. *alba*
"Vesúvio"

▼ *Cattleya harrisoniana*

James Bateman ex. Lindley - 1836

Registro feito no *Botanical Register* 22 Sub. t.1919

Sinônimos:

- ▼ **1838** - *Cattleya harrisoniae* - registro feito por J. Bateman no *Paxton's Magazine of Botany* 4:247
- ▼ **1840** - *Cattleya harrisonii* - registro feito por P.N. Don. no *Florist's Journal*, p.183
- ▼ **1844** - *Cattleya intermedia variegata* - registro feito por Hooker no *Botanical Magazine* t. 4085
- ▼ **1845** - *Cattleya papeiansiana* - registro feito por Charles Morrem no *Annales de Botaniques de Gand* 1:57 t.5
- ▼ **1861** - *Epidendrum harrisonianum* - registro feito por Reichenbach f. em *Walper's Annales Botanices Systematicae* 6:317
- ▼ **1887** - *Cattleya loddigesii* var. *harrisoniae* - registro feito por Veitch no *Manual of Orchidaceous Plants, Cattleya*, p. 42



C. loddigesii var. *estriata* "Courvoisier"



C. loddigesii var. *suave* "Musa"



C. loddigesii var. *maculata* "Caipira"



Premiações Internacionais

Cattleya loddigesii

RHS AWARDS

NOME	RHS	ANO	EXPOSITOR
SUPERBA	AM	1894	R. I. MEASURES
CANIZZARO	AM	1897	SCHRODER
	AM	1936	WILSON

AOS AWARDS

NOME	AOS	ANO	EXPOSITOR
ESTELLE	CCM	1963	J. A. HINCHEY
IOLA STRACK	AM	1975	MRS. FRED AUBE.
20TH. ANNIVERSARY	AM	1975	LEC/AND STRACK

Cattleya harrisoniana

RHS AWARDS

NOME	RHS	ANO	EXPOSITOR
ALBA	FCC	1899	PAYNTER
STANLEY'S	FCC	1908	STANLEY

ODC AWARDS

NOME	ODC	ANO	EXPOSITOR
THE BEST	HCC	1961	MC. LELLAN

AOS AWARDS

NOME	AOS	ANO	EXPOSITOR
THE BEST	HCC	1961	MC. LELLAN
AZUL	HCC	1974	STEWART

Como se vê, no decorrer desses anos poucas foram as premiações concedidas a essas *Cattleyas*, o que comprova que eram pouco divulgadas nos meios orquidófilos.



C. loddigesii var. *punctata* "Vamp"

Cattleya loddigesii:

- ▼ Em 1885, a variedade *maculata* foi descrita no Stein's *Orchidenbuch*.
- ▼ Em 1898, na *Orchid Review*, vol. 8, p. 264, temos a descrição de uma variedade *alba*.

C. harrisoniana var. *rubra* "Pé de Serra"