

Uma Nova Espécie De *Oncidium* Da Chapada Dos Veadeiros.

Oncidium chapadense n.sp. P. Castro & Campacci

Vitorino Paiva Castro Neto (*)

Marcos Antonio Campacci (**)

É de esperar que novas espécies de plantas e, entre essas, espécies da família das Orquidáceas, sejam descobertas na região da Chapada dos Veadeiros. Essa região situada ao norte de Brasília, com elevações que chegam até 1700m de altitude, cria um clima particular, possibilitando o desenvolvimento de espécies endêmicas. Devido à sua altitude, essa região possibilita o aparecimento de um clima mais úmido e frio, onde várias espécies de orquídeas encontraram condições ideais para o seu desenvolvimento. Chama a atenção a existência de um campo de velósias quando se visita essa região, pois tais plantas são típicas dos campos rupestres do estado de Minas Gerais e de partes mais altas da Chapada Diamantina no estado da Bahia, onde existem velósias e se encontram muitas orquídeas.

New species of plants, among these orchids, are still being discovered in the Chapada dos Veadeiros Region. Situated to the North of Brasília, certain areas of this region reach an altitude of 1700m. The high elevation results in cooler and humid conditions which are ideal for the development of a number of species. The fields of Vellozia are of particular interest as they are similar to those found in the rupicolous fields in Minas Gerais and in Chapada Diamantina of Bahia and, usually one encounters a variety of orchids growing on the Vellozia.

Descrição da espécie.

Herba terrestris, caespitoso, Racidibus, flexuosis, glabris; Rhizoma, valde abbreviatum; Pseudobulbis, retanguliformis, lateraliter compressi, 3,0-3,5cm longi, 2,5-3cm lati et crassi, bifoliati. Folia apicalis, filiformis acuminata, 22-25cm longa, 7-10 mm lata; Folia basilaris, similiter folia apicalis, leviter minoris; Sepala dorsualis, elíptico-alongata, leviter conchata, 7,0 mm longa, 2,5-3,0 mm lata; brunnea cum maculae flavae; Sepalae laterales, basis coalitis, elíptico-alongata, asynmetricae, 9,0 mm longae, coloris similiter sepala dorsualis; Petalae, subclaviformis, asynmetrica, 9,0 mm longae, 4,5mm latae, coloris similiter sepalae; Labellum, trilobatum, 18,0mm longum, 15,0mm latum inter lobo lateralis, lobi laterali, elíptici, ad perpendiculum axis oriundus ex basis ad apex labelli, 3,5 mm lati, flavi; lobus centralis subreniformis, tetralobatus (quater lobatus) (cum quattuor lobulus), 13,00 mm longus, 22,00 mm

latus, flavus; calus in discus centralis, divisum in tria tubercula conglobatum, in cornu formis, unum in base labello, duo tubercula in laterali collocato symetrico disco, minore, et unus in centro disco, magnus, tres cornos divisos, centralis maiorem quam lateralem, flavum cum extremitatis albus; Columna, alata, flava, 6,00 mm longa, in basis 1,5 mm larga, inter alae 3,5-4,0 mm larga.



Terrestre, cespitoso, c.a. 20-25 cm de comprimento, Raizes, glabras, flexuosas, alvacentas, c.a. 1,5-2,0 mm, de espessura; Rizoma, bastante curto, Pseudobulbos, esférico-quadrático (retanguliformis), lateralmente achatado, de 3,0-3,5 mm de altura por 2,5-3,0 cm, largura e espessura, com duas folhas basilares, em parte encoberto na base por bainhas das folhas basilares, Folhas, subcoriáceas, superfície ligeiramente granulosa, filiforme aguçada, (graminiforme), de 18-25cm de comprimento por 7-10 mm de largura, as folhas basilares são semelhantes e um pouco menores. Inflorescência, base dos pseudobulbos, ereta, racemosa, c.a. 70-80 cm de comprimento, Escapo, ereto, de 1,5-2,0 mm de espessura, com bainhas amplexas, triangulares de 5 mm de comprimento por 2mm de largura, espaçadas de 7-9cm. Rácemo, cerca de 1/7 do comprimento da inflorescência com 3 a 4 flores abertas, com botões em crescimento e flores abrindo de baixo para cima, brácteas inconspícuas. Ovário, pedicelado, de c.a. 13 mm de comprimento. Flores, agrupadas com c. a. 3,0cm. de diâmetro; Sépala dorsal, elíptico-alongada, ápice truncado e base estreitada, ligeiramente côncava; c.a. 7,0 mm de comprimento por 2,5-3,0 mm de largura, de cor castanho claro, malhado de amarelo; Sépala laterais, concrescidas na base, elíptico-alongadas, assimétricas, de 3,5 mm de largura, de igual

cor à da sépala dorsal; Pétala, subclaviforme, assimétrica, de c.a. 9,0 mm de comprimento por 4,5 mm de largura, de cor igual às sépalas; Labelo, nitidamente trilobado, de c.a. 18 mm de comprimento por c.a. 15 mm de largura entre os lobos laterais; Lobos laterais, elípticos, perpendiculares ao eixo partido da base do labelo em direção ao ápice, de c.a. 3,5 mm de largura, de cor amarelo ouro uniforme; Lobo mediano, subreniforme, esplanado, de c.a. 13 mm de comprimento por c.a. 22 mm de largura, de cor igual à dos lobos laterais; Calos, sobre o disco central em forma de cornos, divididos em tres aglomerados de protuberâncias em forma de cornos, um desses aglomerados na base do labelo, dois pares laterais pequenos simetricamente dispostos e no centro do disco, uma protuberância bem proeminente, dividida em tres cornos, o central maior que os laterais, de cor amarela e esbranquiçado na extremidade; Coluna, alada amarela, de c.a. 6 mm de comprimento por c.a. 1,5 mm de largura na base, de c.a. 3,5-4,0 mm entre as asas; Estigma, glabro; Antena, em forma de capuz, bilobada de

c.a. 2,5 mm de comprimento; Polínias, duas, de c.a. 2,2 mm de comprimento total, com longo caudículo.

HABITAT: Brasil: Goiás: Município de Alto Paraíso de Goiás, 1400-1600 m.sm. leg. Vitorino Paiva Castro Neto.s/n, fl. cult. 05/06/1991.

HOLOTYPE (HERBARIUM SP)

Pelo tamanho da planta tem-se a impressão, à primeira vista, de tratar-se do *Oncidium hydrophyllum*, ou do *Oncidium barbacenae*, ou *Oncidium fuscans*, porém logo nota-se a diferença entre os pseudobulbos que em *Onc. chapadense* são mais estreitos e, também, as folhas basilares mais características dessa espécie. As folhas, muito mais finas, e o calo central, bastante proeminente, distinguem bem esta espécie das outras.

(*) Rua Vicente Galafassi, 459
09770-480 - São Bernardo do Campo, SP.

(**) Rua Padre Leonel Franca, 544- Vila Libaneza
03193-070 - São Paulo, SP.

